

Nota Informativa n.º 8/2024

O Gabinete de Apoio ao Agricultor do Município de Pinhel informa, segundo informação da Divisão de Apoio à Agricultura e Pescas – Estação de Avisos da Guarda, do dia 6 de agosto de 2024, devem seguir-se as seguintes recomendações relativas as plantas dos géneros Vinha, Pomoideas e Olival.

VINHA	
Doença/Praga	Sintomatologia/Recomendação
Oídio da videira	<p>As condições climáticas (orvalhadas matinais) são favoráveis ao desenvolvimento do fungo. Aconselha-se a renovação de tratamento, mantendo a proteção até ao estado fenológico pintor.</p> <p>Recomenda-se a monitorização das parcelas de vinha, em caso de ataque de oídio em cachos, devem proceder a tratamento efetuado com enxofre em pó ou meptildinocape. (ter em atenção às temperaturas acima dos 32º graus, uma vez que este produto pode provocar fitotoxicidade).</p>
Doença do lenho - Esca	<p>Tem como sintomatologia apresentação de coloração amarela ou vermelha entre as nervuras da folha, acabando por secar em altura de stress hídrico. As varas podem não atempar e os cachos murcham e acabam por secar. De forma a reduzir o inoculo da doença na vinha, devem ser implementadas medidas culturais na altura da poda. Aconselha-se nesta altura a marcar as videiras com sintomas, para posteriormente proceder à aplicação de medidas culturais.</p>
Cicadelídeos cigarrinha verde	<p>Atendendo ao aumento de ataque desta praga em vinhas, aconselhar-se a monitorização das parcelas de vinha, de forma a proceder a estimativa de risco através da observação da pagina inferior das folhas de forma a verificar presença de ninfas. Observar 2 folhas x 50 videiras. Se observar 50 ninfas em 100 folhas, deve ponderar a realização de tratamento.</p>
Cigarrinha da Flavescência Dourada – <i>Scaphoideus titanus</i>	<p>Foram capturados adultos desta praga, <i>Scaphoideus titanus</i>, em vinhas localizadas na freguesia de Alverca da Beira / Bouça-Cova.</p> <p>No âmbito do regulamento 2019/2072 e da Portaria 165/2013 de 26 de abril, são estabelecidas medidas de proteção fitossanitária de emergência, destinadas à erradicação da doença e à contenção da dispersão do inseto vetor, bem como o despacho n.º 39/G/2024 da DGAV, onde é publicitado a obrigatoriedade de tratamento às vinhas da freguesia de Alverca da Beira / Bouça Cova, informa-se que devem proceder a tratamentos nas parcelas de vinha desta freguesia, com produto homologado.</p>

POMÓIDEAS	
Doença/Praga	Sintomatologia/Recomendação
Bichado da fruta	Verificou-se um elevado número de capturas de adulto em armadilhas. Face às condições favoráveis para o desenvolvimento da praga, recomenda-se a realização de tratamento , assim que tenha terminado o período de persistência do tratamento anterior.
Piolho de São José	Prevê-se a saída de ninfas da 2ª geração para os próximos dias. Em pomares com presença desta praga, aconselha-se a realização e tratamento com produto homologado e que combata em simultâneo o bichado.
Aranhiço vermelho	As condições climáticas atuais são favoráveis ao desenvolvimento da praga. Deve proceder à monitorização do pomar, efetuando a estimativa de risco através da observação 100 folhas no último terço do ramo (2 folhas x 50 árvores). Se observar 75 das folhas ocupadas, deve proceder a tratamento com um acaricida específico e pouco tóxico para a fauna auxiliar.

Oliveiras	
Doença/Praga	Sintomatologia/Recomendação
Traça Verde ou Palpita	Verificou-se rebentos roídos nos terminais jovens em oliveiras, provocado por esta praga. Os estragos podem inviabilizar a continuidade do crescimento da rebentação, podendo inviabilizar a produção do ano seguinte. Normalmente esta praga é controlada de forma natural. Aconselha-se avaliação da estimativa de risco, procedendo à observação 100 rebentos (5 rebentos x 20 árvores), considerando o nível económico de ataque de 5% de plantas atacadas.

Fonte: Estação de Avisos da Guarda – Circular n.º 11/2024 de 6 de agosto 2024

Para mais informações, queiram por favor dirigir-se ao Gabinete de Apoio ao Agricultor da Câmara Municipal de Pinhel, na Avenida Frederico Ulrich, n.º 5, contactar através do número telefone 271 410 000 / 961 016 961 ou do endereço de correio eletrónico gabinete.agricultor@cm-pinhel.pt.

Pinhel, 07 de agosto de 2024

A Vereadora da Câmara Municipal de Pinhel

Eng.ª Irene de Jesus Fonseca

Anexo à Nota Informativa n.º 8/2024

Insecticidas homologados para o combate à Cigarrinha da Flavesçência Dourada - 2024					
Substância Ativa	Alvo Biológico	I.S. (dias)	Traça da Uva	N.º Ap.	Nome Comercial
Acetamiprida (neonicotinoide)	Ninfas/Adultos	7	Não	1	CARNADINE (Nufarm) (SL) STARPRIDE MAX (Epagro) (SL)
		14		2 (n)	EPIK SG (sipcam) (SG) EPIK SL (Sipcam) (SL)
Ácidos gordos (na forma de sais de potássio)	Ninfas/Adultos	1	Não	5 (a)	FLIPPER (bayer) (EW)
Azadiractina (limonoide)	Ninfas	3	Sim	3 (a)	ALIGN (Sipcam) (EC)
Beauveria bassiana (ATCC 74040)	Ninfas	1	Não	5 (a)	NATURALIS (Fitosistema) (OD)
Cipermetrina (piretróide)	Ninfas / Adultos	21	Sim	1 (p)	CYPRESS (IQV agro PT) (EC)
Deltametrina (piretróide)	Ninfas / Adultos	7	Sim	2 (p)	CONTRAST (Corteva); (EC) DECIS EVO (Bayer) (EW); DELTAPLAN (IQV Agro PT) (EC); Deltina (Agrototal) (EC); SCATTO (Cadubal) (EC); SERINAL (Sipcam) (EC)
Fenepiroximato (pirazol)	Ninfas / Adultos	28	Não	1	DINAMITE (Sipcam) (SC)
Flupiradifurona (Butenolides)	Ninfas / Adultos	14	Não	1	SIVANDO PRIME (Bayer) (SL)
Lambda-Cialotrina (piretróide)	Ninfas / Adultos	7	Sim	2 (p)	ATLAS (Selectis) (CS); JUDO (Ascenza) (CS); KAISO SORBIE (Nufarm) (EG); KARATE ZEON + 1,5 CS (Syngenta); SPARTIERO (Sipcam) (CS)
Piretrinas (piretróide)	Ninfas/Adultos	3	Não	2 (a)	ABAndo (Epagro) (EC); KRISANT EC (Sipcam); NATUR BREAKER (Certis Belchim e Cadubal) (EC); PIRECRIS (Jogravo) (EC); PIRETRO NATURA (Idai Nature) (EC)
Tau-Fluvalinato (Piretróide)	Ninfas / Adultos	21	Sim	2 (p)	EVURE 8Syngenta) (EW); KLARTAN (Adama) (EW)

Fonte: SIFITO (<https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usuarios>)

(I.S.) – Intervalo de Segurança, refere-se a uvas para vinificação; (*) - O primeiro em uva de mesa e o segundo em uvas para vinificação; (**) - Não pode ser usado em uvas de mesa.	(Form.) – Formulação: CS – Suspensão de capsulas; EC – Concentrado de emulsão; EG – Grânulos para emulsão; EW – Emulsão óleo em água; OD – Dispersão em óleo; SC – Suspensão concentrada; SL – Solução concentrada WG – Grânulos dispersíveis em água
(N.º Ap.) – Número máximo de aplicações por ano: - (p) – Máximo de 2 aplicações por ano para o conjunto dos piretróides; - (n) – Máximo de 2 aplicações por ano para o conjunto dos neonicotinoides; - (a) – autorizado em modo de produção biológica.	

A consulta destes quadros não dispensa a leitura atenta do rótulo do respetivo produto fitofarmacêutico.

É necessário verificar sempre se a finalidade pretendida consta do rótulo aprovado.